

Sintomas pós vacinação? Saiba o que fazer!

VACINA CONTRA DENGUE
Butantan-DV™ (Instituto Butantan)
Vacina dengue 1, 2, 3 e 4 (atenuada)
Dose única



A vacina foi aprovada pela Anvisa com os dados de segurança apresentados nos estudos clínicos de fase II e III. A maioria das reações observadas foram de leve a moderada, desaparecendo, em média, até o 5º dia após seu surgimento. Ou seja, são reações autolimitadas.

Confira abaixo as possíveis reações vacinais:

REAÇÕES ESPERADAS	DESCRIÇÃO
Reações muito comuns (≥10%)	• Dor de cabeça • Manchas vermelhas na pele (exantema) • Coceira • Cansaço • Dor muscular ou nas articulações • Dor atrás dos olhos • Náuseas • Dor no local da aplicação
Reações comuns (entre ≥1% e <10%)	• Febre • Tontura • Diarreia • Vermelhidão e inchaço no local da aplicação • Alterações laboratoriais leves (plaquetas, neutrófilos)
Reações incomuns (entre ≥0,1% e <1%)	• Linfadenopatia (gânglios aumentados - "íngua") • Urticária • Apetite diminuído • Dor no pescoço • Afta • Reação alérgica tardia leve



Se cuide! Veja algumas orientações importantes:

Manter boa hidratação

Evitar automedicação

Atenção: os serviços devem notificar todos os eventos pós vacinação

Na persistência de sintomas, procure uma Unidade Básica de Saúde

Para mais informações sobre vacinação contra a dengue, escaneie o QR Code e acesse o site:

